

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-3-83126223

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : (38) 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 90 F

M. le Régisseur de recettes de la
D.D.A. du Loiret

93, rue de Curambourg - B.P. 210
45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

ÉDITION "GRANDES CULTURES"

BULLETIN TECHNIQUE N° 3

8 Mars 1983

COLZA

CHARANÇONS DE LA TIGE DU COLZA :

Depuis la parution de notre dernier bulletin, les premières captures de charançons de la tige du colza ont été constatées dans le réseau de piégeage.

Les captures ont surtout été observées dans l'Indre, le Cher et l'Indre-et-Loire, lors des journées ensoleillées des 5, 6 et 7 Mars.

Dans quelques situations, le nombre de charançons capturés a pu être très important et dépasser le seuil d'intervention en une seule journée, notamment à RIAN (18) : 70 charançons le 5 Mars.

Ces charançons, lorsque les conditions climatiques sont favorables, pondent à la base des tiges, ce qui provoque des déformations et des éclatements de tige responsables de chutes de rendement.



Charançon de la tige du colza
2,6 à 4 mm



Charançon de la tige du chou
2,5 à 3 mm

Il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza : *Ceutorhynchus napi*, avec le charançon de la tige du chou : *Ceutorhynchus quadridens*, qui n'est pas nuisible pour les cultures de colza. Ces deux espèces sont de couleur grise, mais la deuxième est légèrement plus petite, a le bout des pattes roux et possède une tache blanche sur le dos.

Rappelons que la décision de traitement se prend d'après les captures en cuvette jaune placée au niveau du sommet de la végétation.

Seuils d'intervention, produits utilisables :

Se reporter au Bulletin n° 2 du 3 Mars dernier.

Dans les parcelles où le seuil d'intervention est atteint, vu le risque que représente ce ravageur, il est conseillé d'intervenir rapidement.

CHARANÇONS DU BOURGEON TERMINAL :

Les récentes observations en culture montrent que ce ravageur ne se trouve plus désormais cantonné à la Champagne berrichonne.

En 1982, il se trouvait déjà présent dans les régions agricoles limitrophes de la Champagne. Au cours du printemps 1983, sa présence a été notée en Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher (région de Blois), dans de rares secteurs d'Eure-et-Loir, dans le Loiret (Trainou, mais surtout Cercottes).

Dans ces secteurs nouvellement infestés, il faudra se montrer vigilant vis-à-vis de ce ravageur et le surveiller, à l'automne, à l'aide de cuvettes jaunes.

**
*